





أكديماً لصناعة الأدوية البيطرية



أكديماً لصناعة الأدوية البيطرية (أكبيطرة) المحدودة المسؤولة هي واحدة من الشركات التابعة و المنشقة عن الشركة العربية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية (أكديماً) - عمان -الأردن و التي تأسست بموجب قرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام ١٩٧٦.

تأسست أكبيطرة عام ١٩٩٩ كشركة لأنشطة الشركة الأم: (أكديماً) في القطاع البيطري حيث جلت فبراته الطويلة داخل الطب البشري، الخبرات المكتسبة من خلال مشاركته في العديد من شركات الأدوية والمستحضرات الطبية البشرية في الدول الأعضاء في بداية عملها. تعاونت شركة أكبيطرة مع شركتين إسبانيتين: سينافيزا و أوفرجيرو اللتان وقعت اتفاقية معهما لصناعة بموجب ترخيص. وتقوم الشركة بتصنيع معظم أدوية الفئات العلاجية المختلفة للطب البيطري وتحت أشكال صيدلانية مختلفة: (الحقن - الشراب - المساحيق والأقراص)، وفقاً للأفضل المعايير العالمية.

مما يضمن إنتاج دواء يحقق هدفه المتوقع (فعال، مؤكد طبياً، يتوافق مع المعايير الدولية). حيث تنتج شركة أكديماً أدوية المجترات وأدوية الدواجن وأدوية طيور الزينة بالإضافة إلى أدوية الخيول وأدوية الحيوانات المنزلية (كلاب و قطة) حيث يتم وضع مخاططات مستقبلية لإنتاج جميع أنواع الأدوية لتشمل كامل القطاع البيطري.




ACDIVET 
FOR VETERINARY MEDICINES



وكلاوْنَا في الدول العربية و العالمية



العراق - الأردن - اليمن - السودان - عُمان - تشاد





شراب

رقم الصفحة	اسم المنتج	أحجام التعبئة	نوع المنتج
09	أمنوفت	ML 1000	
10	أوموفيت	ML 1000	
11	توكسييل	ML 1000	
12	ديماقيت (آد ٣ هـ)	ML 1000	
13	ديمافيت (آد ٣ هـ)	ML 1000	
14	فيتوفات	ML 1000	
15	هيما - ك	ML 1000	
16	بروكسن % 1	ML 1000	

رقم الصفحة	اسم المنتج	أحجام التعبئة	نوع المنتج
01	ديماتريل % 10	ML 1000	
02	سيبروديما % 20	ML 1000	
03	سيبروديما % 10	ML 1000	
04	ديمافلور	ML 1000	
05	تمليكوسين	ML 1000	
06	فوسين	ML 1000	
07	بياكوكس - س	ML 1000	
08	ديكلازوريل % 2	ML 1000	



بودرة

رقم الصفحة	اسم المنتج	أحجام التعبئة	نوع المنتج
27	كوليديما - م ٢	9 500	91000
28	أمبروديما % ٦٠		91000
29	% ٣٠ نيوبيما	9 500	
30	أزموبيما	9 500	91000
31	ديمافيت - م - بلس	9100	91000
32	ماكسيفور - بلس	9100	9 500
33	سيكوفيت	9 50	9100
34	نيوميتال		9 500
35	نيو- ميتافيت		9 500
36	ديمابيرين - ك		9 500

رقم الصفحة	اسم المنتج	أحجام التعبئة	نوع المنتج
17	سلفابريم		91000
18	سلفاديما - ٤	9100	91000
19	أريثشوديما % ٥٥	9 500	91000
20	أكديموس % ٥٥		91000
21	تيلودوكسيما		91000
22	جنتاندوكسيما		91000
23	دوكسيديما % ٥٥		91000
24	كولي ماكس	9 500	9 500
25	كولي دروكس		9 500
26	نيوترا	9100	9100



حقن

رقم الصفحة	اسم المنتج	أحجام التعبئة	نوع المنتج
37	انزوديما % ١٠	ml 100	
38	تيلوديما - ٢٠	ml 100	
39	لينكوبسيكت	ml 100	



مضادات حيوية

الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة	الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة
بودرة	جنتادوكسيما	22	شراب	ديماتريل 10%	01
بودرة	دوكتيديما 50%	23	شراب	سيبروديما 20%	02
بودرة	كولي ماكس	24	شراب	سيبروديما 10%	03
بودرة	كوليدوكس	25	شراب	ديمالافور	04
بودرة	نيوترا	26	شراب	تلميوكسين	05
بودرة	نيوديما %٣٠	27	شراب	فوسين	06
بودرة	كوليديما - م٢	29	بويرة	سلفابريم	17
بودرة	سيكوفيت	33	بويرة	سلفاديما - 4	18
حقن	انزوديما %١٠	37	بويرة	أريثروديما ٥٥%	19
حقن	تيلوديما - ٢٠	38	بويرة	اكيموس ٥٠%	20
حقن	لينوكسيكت	39	بويرة	تيلودوكسيما	21

فيتامينات - معادن - متممات علفية - أحاضن أمينية

الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة	الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة
بودرة	ماكسيفور - بلس	32	شراب	أمنوفت	09
بودرة	سيكوفيت	33	شراب	أوموفيت	10
بودرة	نيوميتال	34	شراب	تونكوسيل	11
بودرة	نيو- ميتالفيت	35	شراب	ديماقيت (آد ٣ هـ)	12
			شراب	ديماقيت (آد ٣ هـ)	13
			شراب	فيتوفات	14
			شراب	هيمو - ك	15
			بويرة	ديماقيت - م - بلس	31

مضادات كوكسيديا

الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة	الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة
بودرة	أمبروديما %٦٠	28	شراب	بياكوكس - س	07
			شراب	ديكلازوريل 2%	08

منتجات أخرى

الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة
شراب	بروكسن ١% مقشع	16
بودرة	أزموديما معوض شوارد	30

خافضات حرارة و مسكن ألم

الشكل الصيدلاني	اسم المنتج	رقم الصفحة
بودرة	ديمابيرين - ك	36


DIMATRIL 10% antibiotic

ديماتريل 10%



انتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان -الأردن

Production: Acdivet For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Itd
belongs to Acdivet Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 مل يحتوي على:
إينروفلاوكساسين 100 ملغ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

ديماتريل 10 % يعطي لمعالجة الالتهابات المعدية والمعوية والتنفسية والبولية التناسلية وغيرها من الالتهابات الناجمة عن الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام وكذلك الميكوبلازما والكلاميديا.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:
الدواجن: مل / ٢٠٠ ليتر ١٠٠

من ماء الشرب لمدة ٣ أيام على الأقل.

و عند الإصابة بالسالمونيلا : يتم العلاج لمدة ٥ أيام على الأقل.

العجول والأغنام والماعز: مل / ١٠٠ كغ من وزن تعطى على جرعتين صباحاً و مساء لمدة (٥-٣) أيام.

الأرانب والكلاب والقطط: ٥ ملخ لكل ١ كغ من وزن الجسم أو (١ مل لكل ٢٠ كغ من وزن الجسم) بمدة علاج من ٣ - ٥ أيام حسب شدة الإصابة كإصابة بالسالمونيلا والإصابة التنفسية الشديدة وغيرها.

فترة السحب : لحم المجترات : ٧ أيام - لحم الدجاج والأرانب ٤ أيام
الحليب: ٣ أيام

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ ليتر + ١٠٠ مل.

www.acdivet.sy



سيبروديما %20

التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

سيبروفلوكساسين 200 ملг
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم في معالجة الاصابات الناتجة عن الجراثيم ايجابية الغرام مثل المكورات العنقودية والمكورات العقدية والكوريني باكتيريوم والكتوستريدا والليستيريا والجراثيم سلبية الغرام مثل الاشريشية كولي والهيوموفيلس والباستوريلا والسلالمونيلا والكلبيسلا والكلاميديا وأنواع الميكوبلازما. يوصف لعلاج نطاق واسع من الإنثانات عند الدواجن و الحيوانات الكبيرة كما في الحالات التالية: الأمراض التنفسية المزمنة - التهابات الجيوب - الإصابة بالإيكلاي - إنثانات كيس المح - الإصابة بالسلالمونيلا والإسهالات الناتجة عنها - اصابات الكوليرا - الالتهابات المغوية والإسهالات - التهابات الكلى والمجاري البولية - التهابات الطرق الصفراوية - البروسيللا الماطية - إنثانات الجلد والأنسجة الرخوة - إنثانات العظام و المفاصل - تجرثم الدم.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

الدواجن: ٥٠ مل / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب و لمدة ٣ - ٥ أيام.

العجل و الماعز والأغنام : ١٠٠,٥ مل / ١٠٠ كغ من الوزن تعطى على جر عينين صباحاً و مساء لمدة (٥-٣) أيام.

فترة السحب : اللحم : ٧ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لتر.



antibiotic

CIPRODIMMA 20%



www.acdivet.sy

CIPRODIMA 10% antibiotic

www.acdivet.sy



سيبروديما 10%



انتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdivma For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Itd
belongs to Acdivma Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

سيبرو-فلاوكساسين 100 ملخ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم في معالجة الاصابات الناتجة عن الجراثيم ايجابية الغرام مثل المكورات العنقودية والمكورات العقدية والكوريني باكتيريوم والكلوستريدا والليستيريا والجراثيم سلبية الغرام مثل الاشريشية كولي والهيوموفيلس والباستوريلا والسامونيلا والكلبيسلا والكلاميديا وأنواع المايكوبلازم. يوصف لعلاج نطاق واسع من الإلثارات عند الدواجن والحيوانات الكبيرة كما في الحالات التالية: الأمراض التنفسية المزمنة - التهابات الحيوان - الإصابة بالإيكولاي - إلثارات كيس المح - الإصابة بالسامونيلا و الإسهالات الناتجة عنها - إلثارات الكولييرا - الالتهابات المعدية والإسهالات - التهابات الكلى و المجرى البولية - التهابات الطرق الصفراوية - البروسيلال الماطية - إلثارات الجلد و الأنسجة الرخوة - إلثارات العظام و المفاصل - تحرّم الدم.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

الدواجن: ١٠٠ مل / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب و لمدة ٣ - ٥ أيام.

العجول و الماعز و الأغنام : ٢-١٠ مل / ١٠ كغ من الوزن تعطى على جرعتين صباحاً و مساء لمدة ٥-٣ أيام.

فترقة السحب : اللحم : ٧ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لتر.

ديمافلور

التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

فلورفينيكول 100 ملغ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يحتوي ديمافلور على مركب الفلورفينيكول و هو من المضادات الحيوية ذات التأثير الواسع الطيف و بالتالي يستخدم ديمافلور لعلاج الحالات التالية:

- الاصابة بالتهابات الجهاز الهضمي و الجهاز التنفسى الناتجة عن الجراثيم السلبية و ايجابية الغرام مثل: المكورات العنقودية - المكورات العقدية - الباستيريلا - انتروباكتر - الكليسيلا - الشيغلا - الكورينياكتيريوم - الكلوستريديوم الاشريشيا كولي - الفوسوباكتيريوم الهيوفيلوس - البورديتيلاء - البروتوكسالامونيلا و انواع اخرى من الجراثيم الممرضة.

الجرعة و طريقة الاستعمال: يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

٢٠٠ - ٣٠٠ مل / ٢٠٠ لیتر من ماء الشرب

(أي ما يعادل ٢٠ - ٣٠ مل / كغ وزن حي لمدة ٧-٥ أيام متتالية)

فترة السحب : اللحم: ٧ أيام

الحفظ : في مكان جاف و مظلم
و درجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لیتر.



antibiotic
DIMAFLOR

TILMICOSIN antibiotic

www.acdivet.sy



تلميكسين



إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

تلميكسين فوسفات 250 مل
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يُستعمل تلميكسين للسيطرة على الاصابات التنفسية عند الدواجن و الناجمة عن الاصابة بالباستيريلا متعددة النفوذ و المايكوبلازما الطيرية. و للتلميكسين فعالية ايضا ضد المتعضيات موجة الغرام و بعض سالبة الغرام و اللولبيات و المتفطرات.

الحيوانات المعالجة: الدواجن.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

٦٠ مل / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب لمدة ٣ ايام.

فترقة السحب : اللحم : ٧ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ ليتر أو ١ ليتر.

فوسين

التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

فوسفومايسين كالسيوم 250 ملغ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

الفوسفومايسين مضاد حيوي ذو تأثير قاتل للجراثيم عن طريق تثبيط اصطناع الجدار الخلوي الجرثومي.

يستعمل لعلاج الانتانات الناتجة عن الجراثيم ايجابية و سلبية الغرام مثل الاشريشية كولي و السالمونيلا و الباستوريلا و المتنقلات و الهيماوفيلس و العقدوديات و العقديات و الكورينيبياكتريوم.

الحيوانات المعالجة: الدواجن.


الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

يعطى عن طريق مياه الشرب بجرعة وسطية من المادة الفعالة و هي ٤٠ مل/كغ من وزن الجسم لمدة ٣-٥ ايام. او ٢٠٠-١٥٠ مل / ٢٠٠ لتر ماء الشرب.

فترة السحب : اللحم : ٧ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ١٥-٢٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ ليتر أو ١ ليتر.



ZIN
FUSIN
antibiotic

BIACOCS-S anticoccidial

www.acdivet.sy



بياكوكس - س



انتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdiva For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Itd
belongs to Acdiva Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

تولترازوريل 25 ملغ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

الاصابة بالكوكسيديا عند الدواجن الناجمة عن أنواع الاميريا التالية:
تينيلا - ميتيس - برونيتي - نيكاتريكس - ماكسيميا - بريوكوكس.
فال ضد الجيل الثاني (المنقسمات) و الاطوار الجنسية من الاميريا تينيلا.
يمنع تبوغ الطور البوغي.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

٢٠٠ مل / ٢٠٠ لتر ماء لمدة ٤٨ ساعة فقط (٢ يوم).
او يعطى بمقادير ٦٠٠ مل / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب
و لمدة ٨ ساعات فقط يوميا لمدة ٢ يوم.

فترة السحب : اللحم : ١٨ يوم.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ لیتر او ١ لیتر.

ديكلازوريل 2%



التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

ديكلازوريل 20 ملغ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

الاصابة بالكوكسیديا عند الدواجن الناجمة عن أنواع الایمیریا التالية:
تینیلا - میتیس - برونیتی - نیکاتریکس - ماکسیما - بریکوکس.
فعال ضد الجیل الثانی (المتقسمات) و الاطوار الجنسیة من الایمیریا تینیلا.
كما یمنع تبوغ الطور البوغی.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

٢٥ مل / ٢٠٠ لتر ماء لمدة ٤٨ ساعة (٢ يوم).
في الحالات الشديدة ٥٠ مل / ٢٠٠ لتر ماء و لمدة ٤٨ ساعة (٢ يوم).

فترة السحب : اللحم و البيض: ٥ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لیتر.



DICLAZURIL 2%

anticoccidial

DICLAZURIL 2%

www.acdivet.sy

أمنوفت

AMNOVET

vitamins & Amino acids



إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكديطرو) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

فيتامين A 10,000 (ملاي) - فيتامين D3 2,000 (ملاي) - فيتامين E 2 (ملاي)
فيتامين B1 2 (ملاي) - فيتامين B2 3 (ملاي) - فيتامين B6 1.5 (ملاي)
فيتامين B12 0.0025 (ملاي) - نيكتوبتنياميد 18 (ملاي) - د. بانثينول 8.5 (ملاي)
الاينين 6.625 (ملاي) - ارجنин 5.5 (ملاي) - اسيباراك أسيد 9.125 (ملاي)
سيستينين 1.5 (ملاي) - فينل الاينين 4.875 (ملاي) - غلوتاميك أسيد 15.75 (ملاي)
غليسين 5.75 (ملاي) - هيسستين 2.125 (ملاي) - ايسولوسين 4.75 (ملاي) - ليوسين 8 (ملاي) ليسين 7.875 (ملاي) - ميثونين 1.875 (ملاي) - برولين 5.125 (ملاي) - سيرين 6.75 (ملاي)
تيروسين 3.125 (ملاي) - ثريونين 3.575 (ملاي) - فالين 7.25 (ملاي)

سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

بحوي على مجموعة كبيرة و متكاملة من الفيتامينات و الأحماض الأمينية الضرورية للجسم و وبالتالي يمكن استخدامه في الحالات التالية: قبل و بعد تطبيق التحصينات من أجل التخفيف من الآثار المجهدة للقاح و المساعدة على تشكيل أفضل المناعة. في حالات الإجهاد و فقدان الشهية و بعد المعالجة بالصادات الحيوانية أو في حال الإصابة بالديدان من أجل زيادة التغذية الطفلي و وبالتالي تعزيز النمو و زيادة الأوزان في حالات التسمين و زيادة إنتاج الطليب. من أجل التجييز لموسم التناول في المجترات حيث يسمى في رفع الكفاءة التناسلية للذكور و الإناث.

خلال الحمل الوقاية من حدوث الإجهاض المنسحب عن نقص الفيتامينات و الأحماض الأمينية من أجل زيادة إنتاج البيض في الدجاج البياض و تحسين نوعية البيض و القشرة. و زيادة نسب الإخصاب و الفقس.

يستخدم بشكل عام في جميع حالات عوز الفيتامينات و كمنشط للنمو و زيادة الإنتاج.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

١٠٠ مل / ٢٠٠ لتر من مياه الشرب لمدة ٥-٣ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لتر.



أومو فيت

التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

فيتامين A (10,000 و. د) - فيتامين D3 (2,000 و. د) - فيتامين E (2 ملخ)
 فيتامين B1 (2 ملخ) - فيتامين B2 (3 ملخ) - فيتامين B6 (1.5 ملخ)
 فيتامين B12 (0.0025 ملخ) - فيتامين ث (0.75 ملخ) - فيتامين ك (0.75 ملخ)
 نيكوتيناميد (18 ملخ) - د. بانثينول (8.5 ملخ) - الانتين (12 ملخ)
 أرجين (7.8 ملخ) - أسيارتاك أسييد (15.6 ملخ) - سيسبيتيدين (1.2 ملخ)
 فينيل الانتين (7.8 ملخ) - غلوتاميك أسييد (17.4 ملخ) - غليسين (13.8 ملخ)
 هيسبيتين (6.6 ملخ) - إيسوليوسین (1.8 ملخ) - ليوسین (15 ملخ) - ليسين (13.2 ملخ)
 ميثيونين (1.2 ملخ) - برولين (9.6 ملخ) - سيرين (7.8 ملخ) - تيروسين (3.6 ملخ)
 ثريونين (6.6 ملخ) - فالين (10.2 ملخ) - سواغات ك.ك حتى 1 مل

الاستطباب والحيوانات المعالجة :

يحتوي على مجموعة كبيرة ومتقدمة من الفيتامينات والأحماض الأمينة الضرورية للجسم وبالتالي يستخدم في الحالات التالية: قبل وبعد تطبيق التحصينات من أجل التخفيف من الآثار المجهدة للدجاج و المساعدة على تشكيل أفضل للمناعة في حالات الإجهاد وفقدان الشهية وبعد المعالجة بالصادات الحيوية أو في حال الإصابة بالديدان من أجل زيادة التحويل العقلي و زيادة الأوزان و زيادة إنتاج الحليب من أجل زيادة إنتاج البيض في الدجاج البياض وتحسين نوعية البيض و القشرة زيادة نسب الإخصاب والفقس وتحفيز ظهور أعراض نقص الفيتامينات في الصيصان الفاسقة - التجهيز لموسم التناول في المحترفات حيث يسمى أومو فيت في رفع الكفاءة التنازلية للذكور والإناث - خلال فترة الحمل في المحترفات الوقاية من حدوث الإيجاص المتسبب عن نقص الفيتامينات والأحماض الأمينة يستخدم في جميع حالات عزز الفيتامينات وكمشط للنمو و زيادة الإنتاج.

الجرعة و طريقة الاستعمال: يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:
 ١٠٠ مل - ٢٠٠ مل / ٢٠٠ لتر من مياه الشرب لمدة ٥-٣ أيام.

فترة السحب: لا يوجد

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و برجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

المعبأة: عبوات سعة ١ لتر.



vitamins & Amino acids
OMOVET



www.acdivet.sy

توكوسيل

TOCOSEL
vitamins

www.acdivet.sy



إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdiva For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdiva Amman-Jordan.



ال التركيب: كل ١ مل يحتوي على :

فيتامين E أسيتات 50 ملг
سيلينيوم (صوديوم سيلينيت) 0.46 ملг
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

علاج مرض ابيضاض العضلات في العجول والمواليد الحديثة (ضمور العضلات) ومرض تخشب الحملان - علاج التهاب الكبد الغذائي وتلكس عضلة القلب والعضلات الهيكلية - اضطرابات الإخصاب عند الذكور و إناث الحيوانات حالات انخفاض إنتاج البيض في الدجاج البياض و حالات انخفاض نسب الإخصاب و الفقس في الأمهات و الدجاج المنتج لبيض التفريخ مرض الرخاوة المخينة (الصوص المجنون) في الدواجن - مرض الارتشاح الونمي من أجل رفع المناعة لدى الدواجن و الحيوانات المختلفة في التحضير لموسم التزاوج من أجل رفع قدرة الذكور على الإخصاب ورفع قدرة الإناث على الحمل التوأمى يعطى للنوع الحاصل في فترات الحمل من أجل الوقاية من ظهور مرض العضلات البيضاء في المواليد.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع ماء الشرب عن طريق الفم:

الدواجن والحملان والأمهار والعجول والابقار والأغنم والماعز:

الدواجن: يستخدم بمقدار ١٠٠ مل / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب في حالات الوقاية و بجرعة ٢٠٠ مل / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب في حالات المعالجة و تستمر المعالجة مدة ٧-٥ أيام. الحالن: ١ مل لكل حيوان يومياً و لمدة ٥ أيام.

الأمهار و العجول: ٣-٢ مل لكل حيوان يومياً و لمدة ٥ أيام.

الابقار و الخيول: ٥-٣ مل لكل حيوان يومياً و لمدة ٥ أيام.

فترة السحب: لا يوجد.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لتر.

ديمافيت (آد ٣٩)

التركيب: كل ١ مل يحتوي على :

فيتامين A	بالمilliliters
فيتامين D3 (كولي كالسيفيرول)	وحدة دولية 40,000
فيتامين E (الفاتوكوفيرول أسيتات)	وحدة دولية 10,000
سواغات كمية كافية حتى	20 ملغ
	1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يحتوي ديمافيت على ثلات فيتامينات أساسية للحيوانات و الطيور حيث تلعب هذه الفيتامينات دور حيوي هام في المحافظة على الحالة الصحية و المناعية و رفع الإنتاج بالإضافة لدورها في الوقاية من العديد من الأمراض و بشكل خاص الأمراض التنفسية و المعدية بالإضافة لرفع المناعة تجاه الأمراض الفيروسية. بالإضافة إلى رفع الخصوبة و نسب الانتاج و القفس و الوقاية من الأمراض العضلية و العصبية (كمرض الصوص المجنون و ابيضاض العضلات). و الوقاية من حالات الكساح و ظهور البيض الرقيق أو عدم القشرة في الدجاج المنتج للبيض. تأخر النمو - الكساح - لين العظام - ضمور العضلات - اضطرابات الأغذية المخاطية و الظهارية - الإجهادات - الولادات المبكرة - الإجهاد - الإصابة بالأمراض التنفسية - الاضطرابات الجنسية - بعد المعالجة بالمضادات الحيوية و خلال فترة النقاوه - من أجل زيادة معدلات النمو و الإنتاج - حالات الحمل.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم و لمدة ٣-٤ أيام:

- الدواجن: ١٠٠ مل / ٢٠٠ لتر (برميل) ماء شرب.
- الأغنام و الماعز: ٥ مل لكل حيوان.
- الأبقار و الجمال و الخيول: ٢٠ مل لكل حيوان.
- العجول و الأمهار : ١٠ مل لكل حيوان.
- الحيوانات الصغيرة: ٤-٦ مل لكل حيوان.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ ليتر.



vitamins
DIMAVIT AD3E

www.acdivet.sy

DIMAVIT (AD3EC) vitamins

www.acdivet.sy



ديمافيت (آد ٣ إتش)



إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(اكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdivet For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdivet Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 مل يحتوي على:
فيتامين A بالمليات 50,000 وحدة دولية
فيتامين D3 (كولي كالسيفيرول) 5,000 وحدة دولية
فيتامين C 100 ملغ
فيتامين E 20 ملغ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

يحتوي ديمافيت على أربعة فيتامينات أساسية لحياة الحيوانات والطيور حيث تلعب هذه الفيتامينات دور حيوي هام في المحافظة على الحالة الصحية والمناعية للطيور والحيوانات ورفع الإنتاج بالإضافة لدورها في الوقاية من العديد من الأمراض وبشكل خاص الأمراض التنفسية والمعوية بالإضافة لرفع المناعة تجاه الأمراض الفيروسية. بالإضافة إلى رفع الخصوبة ونسب الانتاج والنفس والوقاية من الأمراض العضلية والعصبية (كمرض الموصى المجنون وأيضاض العضلات).
و الوقاية من حالات الكساح و ظهور البيض الرقيق أو عدم القشرة في الدجاج المنتج للبيض تأثير التمو - الكساح - لين العظام - ضمور العضلات - اضطرابات الأغذية المخاطية و الظهارية - الإجهادات - الولادات المبكرة - الإجهاد - الإصابة بالأمراض التنفسية -
الاضطرابات الجنسية - بعد المعالجة بالمضادات الحيوية و خلال فترة النقاوة - من أجل زيادة معدلات التمو والإنتاج - حالات الحمل.

الجرعة و طريقة الاستعمال: يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم ولمدة ٣-٤ أيام:
الدواجن: ١٠٠ مل / ٢٠٠ لتر (برميل) ماء شرب.

الأغنام و الماعز: ٥ مل لكل حيوان / الأبقار و الجمال و الخيول: ٢٠ مل لكل حيوان.
العجول و الأمهار: ١٠ مل لكل حيوان / الحيوانات الصغيرة: ٤-٢ مل لكل حيوان.

فترة السحب: لا يوجد

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لتر

فيتوفات

التركيب: كل ١ مل يحتوي على :

فيتامين آ باليمنات 10,000 وحدة دولية

فيتامين د3 (كورلي كالسيفيرول) 1,000 وحدة دولية

فيتامين E (الفاتوكوفيرول أسيتات) 4 ملخ

سواغات كمية كافية حتى 1 مل

فيتامين آ باليمنات

فيتامين د3 (كورلي كالسيفيرول)

فيتامين E (الفاتوكوفيرول أسيتات)

سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

تأخر النمو - الكساح - لين العظام - ضمور العضلات - اضطرابات الأغشية المخاطية و الظهارية - الإجهاضات - الولادات المبكرة - الإجهاد - الإصابة بالأمراض التنفسية - الاضطرابات الجنسية - بعد المعالجة بالمضادات الحيوية و خلال فترة النقاوة - من أجل زيادة معدلات النمو و الإنتاج - حالات الحمل.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم و لمدة ٣-٢ أيام:

الدواجن: ١٠٠ مل / ٢٠٠ لتر (برميل) ماء شرب.

الأغنام و الماعز: ٥ مل لكل حيوان.

الابقار و الجمال و الخيول: ٢٠ مل لكل حيوان.

العجول و الأمهار: ١٠ مل لكل حيوان.

الحيوانات الصغيرة: ٤-٢ مل لكل حيوان.

فترة السحب: لا يوجد.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لتر.



VITOFAT
vitamins



www.acdivet.sy

هيمو-ك

HAEMO-K vitamins



إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرة) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

فيتامين ك 3 صوديوم بيسلافيت

سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم في الدواجن للوقاية او لعلاج حالات النزيف العامة او المرافقة لبعض الحالات المرضية مثل الكوكسيديا و الجمبورو و المتلازمة النزفية.

يستخدم قبل قص المناشير و بعد قصها لتجنب حالات النزيف.

يستخدم في حالات نقص فيتامين ك 3 بشكل عام و الناتجة عن احد الاسباب التي ورد ذكرها سابقا.

الجرعة و طريقة الاستعمال يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم .

الوقاية : يستخدم بمعدل (٥٠٠ مل) لكل ٦ لتر من ماء الشرب لمدة ٨ - ١٠ أيام.

العلاج: يستخدم بمعدل (١ مل) لكل ٦ لتر من ماء الشرب لمدة ١٠-٨ أيام.

فترقة السحب : لا يوجد.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ لتر.



بروكسن ١%

10 مل
1 مل

التركيب: كل ١ مل يحتوي على :

برومهكسين هيدروكلورايد
سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم بروكسن كمذيب للقشع و المخاط مما يسهل خروجها من القصبات الهوائية و الرغامي فيصبح التنفس أكثر سهولة . كما يستخدم عند الدواجن أثناء معالجة الأمراض التنفسية المزمنة - التهاب القصبات (البرونشيت) - التهاب البلعوم - التهاب الرغامي - الكوريزا - ذات الرئة في الحيوانات اليافعة و ذات الرئة الفضفية و التهاب الأنف و في جميع الحالات التي تترافق مع سعال رطب.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم .

الدواجن: مل / ٢٠٠ لتر ماء شرب لمدة ٥-٣ أيام.

الأبقار و العجول و الأمهار: مل / ١٠ كغ وزن حي يومياً لمدة ٥-٣ أيام.

الأغنام و الخراف: مل / ٤٠، ٢٠، ١٠ كغ وزن حي يومياً لمدة ٥-٣ أيام.

فترة السحب : ٢ يوم قبل الذبح.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة : عبوات سعة ١ ليتر.



www.acdivet.sy

MUCOLYTIC
BROXINE 1%

سلفابريم

SULFAPRIM Sulfonamides



إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرة) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 غ يحتوي على :

400	ملغ	سلفاديازين الصوديوم
80	ملغ	تريميثوبريم
1	غ	سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب والحيوانات المعالجة :

يعطى السلفابريم في الدواجن والأبقار والأغنام والماعز لعلاج انتانات الجهاز الهضمي والتنفسى الناتجة عن الجراثيم التي تتأثر بالسلفاديازين و التريميثوبريم مثل: الاشريشيا كولى - الهموفيلوس- الباستوريلا - السالمونيلا - المكورات العنقودية - المكورات العقدية.

الجرعة و طريقة الاستعمال يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم .

الدواجن : ١٠٠ غ لكل ٢٥٠ لتر من ماء الشرب لمدة ٧-٤ أيام.
الأبقار والأغنام والماعز : ٥ غ لكل ١٠٠ كغ من وزن الجسم / مرتان يومياً ولمدة ٥-٤ أيام..

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ ليتر.

www.acdivet.sy



سلافاديمـ4

التركيب: كل 1 غ يحتوي على :

100 ملغ	سلفاميرازين الصوديوم
60 ملغ	سلفاديازين الصوديوم
40 ملغ	سلفاتيازول الصوديوم
40 ملغ	تربيسيثوبريم
1 غ	سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

لمعالجة الأخاج الناتجة عن الإصابة بجراثيم إيجابية وسلبية الغرام و الإصابات الناتجة عن كائنات مقاومة للصادات الحيوية الأخرى.
أخماج الجهاز التنفسى و البولى التناسلى و المعدى المعوى و أخماج القناه الهضمية و التسمم الدموي و الجروح.
أخماج غير معروفة السبب و الكوكسيديا و الكوريزا.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم .

الدواجن: ١٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب.

العجول و الحملان: ٤ غ لكل ٥٠ كغ من الوزن الحي و لمدة ٥-٣ أيام متتالية.

فترة السحب : ١٠ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١٠٠ غ - ١ كيلو غرام.



SULFADIMIDES

SULFADIMA-4

ERYTHRODIMA 50% Antibiotic



www.acdivet.sy



اريثروديما %50



إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكديطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdivet For Veterinary
Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل ١ غ يحتوي على :

500 ملغ
1 غ

أريثروميسين ثيوسيانات
سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم أريثروديما ٥٠ بودرة ذواقة في الماء عند الدواجن لعلاج الأمراض التنسفية المزمنة (CRD) الناتجة عن الميكوبلازما و الامراض التنسفية الناتجة عن الجراثيم الحساسة للاريثروميسين مثل المكورات العنقودية الذهبية (التهاب المفاصل الخمسي) و المستدمية من نوع باراغاليناروم (المسببة لمرض الكوريزا) و الباستوريلا ملتوسیدا (المسببة لمرض الباستوريلا و ذات الرئة).

الجرعة و طريقة الاستعمال يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم .

الدواجن: ٤٤ - ٨٠ غ / (٢٠٠ لتر) ماء يوميا.

فترة السحب : ٤٨ ساعة قبل الذبح.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ كيلو - ١ كيلو.

أكديموكس %50

500 ملخ.

1 غ.

التركيب: كل 1 غ يحتوي على :

أموكسيسيللين تري هيدرات

سواغات كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم أكديموكس %50 في الدواجن و الحيوانات الأخرى (عجول - خراف - صغار الماعز - الأمهار) لعلاج الانتانات الجرثومية الهضمية والبوليية والتنتاسلية و التنسفية الناتجة عن الجراثيم سلبية الغرام و ايجابية الغرام مثل : الاشريشيا كولي - الكلوستريديا - السالمونيلا - البرتواس - كورينبياكتيريوم - ليستيريا - الباستوريلا - المكورات العقدية - المكورات العنقودية.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم.

الدواجن: ٤٠ غ / ٢٠٠ لیتر من ماء الشرب و لمدة ٥ أيام متتالية.

الخراف و الجداء و العجول و الأمهار: ٢٨-٢ غ / حيوان مرتان بالليوم لمدة ٥ أيام متتالية.

فترة السحب: لحم الدواجن: ٢ يوم - لحم الثدييات: ٧ أيام - البيض: ٣ أيام.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ١٥-٢٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ كيلو.



Antibiotic
ACDIMOX 50%



www.acdivet.sy

TYLODOXIMA Antibiotic

www.acdivet.sy



تيلودوكسيما

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكديطرو) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 غ يحتوي على :

200 ملغم
200 ملغم
60 ملغم
1 غ

تيلوزين طرطرات
دوكتسيكلين
كرولستين سلفات
سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يسخدم تيلودوكسيما في الحالات المرضية التالية:
اصابات الجهاز التنفسي بما فيها المرض التنفسى المزمن (CRD) و الكوريزا و الاصابات الميكوبلازما في الجهاز التنفسي.
اخماج الجهاز الهضمي الناتجة عن الجراثيم سلبية الغرام و بشكل خاص الجراثيم من عائلة الامعاءات و شمل الاشريشيا كولي و البوتوس و الشigellosis و السالمونيلا و غيرها.
الاسهالات جرثومية المنشأ.

التهابات المفاصل الناتجة عن متاعب حساسة للتيلوزين و الدوكتسيكلين بما فيها الاصابة بالميکوبلازما المفصالية و انواع اخرى من الجراثيم الحساسة.
داء الكلاميديا (المتدثرات) و خصوصا في الحمام و طيور الزيته و البيغانيات.
التهابات الجلد الناتجة عن الاصحاح الحرثومية.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم .

الدواجن : ١٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب و تستمر المعالجة ٥-٣ أيام متتالية.
طيور الزيته : ١ غ / ٢ لتر من ماء الشرب لمدة ٥-٣ أيام متتالية تستمر المعالجة في حالات الاصابة بالكلاميديا لفترة اطول بحسب توصيات الطبيب المشرف.

فترقة السحب : لحوم الدواجن: ٢ يوم.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ كيلو.

جنتادوكسيما

التركيب: كل ١ غ يحتوي على :

جنتاميسين سلفات	100 ملг
دوكتسيكلين هيدروكلورايد	100 ملг
سواغات كمية كافية حتى	١ غ

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

الالتهابات الجرثومية للجهاز التنفسى و الجهاز الهضمى و خاصة ضد العصيات القولونية و السالمونيلا و عدوى الجهاز البولى التالسي الناجمة عن البكتيريا ايجابية الغرام والبكتيريا سلبية الغرام الحساسة للجنتاميسين و الدوكتسيكلين عند الدواجن.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم .

الدواجن : ١٠٠ - ٢٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب و تستمر المعالجة ٥-٣ أيام متالية.
طيور الزيبة : ١ غ / ٢ لتر من ماء الشرب لمدة ٥-٣ أيام متالية تستمر المعالجة في حالات الاصابة بالكلاميديا لفترة اطول بحسب توصيات الطبيب المشرف.

فترة السحب: لحم الدواجن : ٢ يوم .

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ١٥-٢٥ درجة مئوية .

التعبئة: عبوات سعة ١ كيلو .



Antibiotic

GENTADOXYMA

www.acdivet.sy

DOXYDIMA 50% Antibiotic

www.acdivet.sy



دوكتسيديما %50

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(اكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary
Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 غ يحتوي على :

دوكتسيديكلين هيدرات
500 ملг
1 غ

سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب والحيوانات المعالجة :

دوكتسيديكلين : هو مضاد حيوي واسع الطيف من مجموعة التتراسيكلينات و التي هي من المضادات الحيوية الموقعة لنمو و تكاثر الجراثيم. حيث يؤثر الدوكتسيديكلين على تصنيع البروتين في الخلاية الجرثومية كما هو الحال في بقية افراد المجموعة . يؤثر الدوكتسيديكلين على البكتيريا ايجابية و سلبية الغرام على حد سواء و خصوصا تلك المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي حيث يبدي تأثير قوي و مميز على الجراثيم سلبية الغرام المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي و بشكل خاص يبدي فعالية قوية على جراثيم المايكوبلازما و رائيم الكلاميديا . و يمتاز الدوكتسيديكلين بامتصاص سريع و جيد من القاء الهضمية عند إعطائه عن طريق الفم مع مياه الشرب و يبلغ التوازن الحيوي للدوكتسيديكلين ما يقارب (١٠٠٪) مع ارتباط بروتين بنسبة (٩٠٪) و يتم الاستقلاب في الكبد و الاطراح بشكل اساسي عن طريق الكلى (مع البول).

يستعمل الدوكتسيديكلين في معالجة التهاب الجهاز التنفسي الناجم عن الميكوبلازما او الكلاميديا كما يستعمل في معالجة التهابات الجهاز التناسلي الناجمة عن الكلاميديا و يستعمل في معالجة التهابات الرئة و الممرات التنفسية العلوية و التهاب الجيوب الناجم عن الجراثيم المساعدة.

الجرعة و طريقة الاستعمال: يعطي مع مياه الشرب عن طريق الفم.

الدواجن : ٤٠-٢٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب
و تستمر المعالجة ٥-٣ أيام متتالية.

فترقة السحب : لحوم الدواجن: ٧ أيام.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ كيلو - ١ كيلو.

كولي ماكس

التركيب: كل ١ غ يحتوي على :

640 ملخ

أموكسيسيللين تري هيدرات

3,200,000 وحدة دولية

كوليستين سلفات

١ غ

سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم كولي ماكس بودرة ذابة في الماء للعلاج و السيطرة على الانتانات الجرثومية الناتجة عن الجراثيم المتحسسة للأموكسيسللين و الكوليستين مثل: الاشريبياكولي - السالمونيلا - الباستيريلا - العصيات الشعاعية - محبات الدم، المكورات العقدية - المكورات العنقودية الحساسة البنسلين.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم.

الدواجن: أقل من ٤ أسابيع (١٤ / ٥-٧,١٠ لتر ماء لمدة ٥-٣ أيام).

الدواجن: أكثر من ٤ أسابيع (١٤ / ٧,٥-٥ لتر ماء لمدة ٥-٣ أيام).

الخنازير: ١٤ / ٦-٤ لتر ماء شرب لمدة ٥-٣ أيام او ١ غ / كغ علف.

فترة السحب: اللحم : ٣ أيام.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ كغ.



Antibiotic
COLIMAX



www.acdivet.sy

COLIDOX Antibiotic

www.acdivet.sy



25

كوليدوكس

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرو) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary
Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 غ يحتوي على :
دوكسيسيكلين هيكلاست
كولستين سلفات
سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

الالتهابات الجرثومية للجهاز المعدى المعوى و خاصة ضد العصيات
الكولونية و السالمونيلا عند الدواجن.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم و لمدة ٥-٣ أيام:
١٠٠ - ٢٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب.

فترقة السحب : يومان.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ كغ.

نيوترا



التركيب: كل ١ غ يحتوي على :

أوكسيتاسيكلين هيدروكلورايد	200 ملغ
نيومايسين سلفات	200 ملغ
سواغات كمية كافية حتى	١ غ

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

الأخماج الجرثومية للطرق التنفسية و المعدية المعوية، و اخماج العصيات القولونية و السالمونيلا، و المرض التنفسي المزمن (CRD) و كوليرا الطيور و الزكام المعدى و الاصهالات الجرثومية .

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

١٠٠ غ / ٢٠٠ لتر ماء شرب لمدة ٥-٣ أيام.

العبول و الحملن: ٥ غ / ١٠٠ كغ وزن حي كل ١٢ ساعة و لمدة ٣ أيام.

تحذيرات: لا يعطى عن طريق الفم للمجررات الكبيرة.

فترة السحب: اللحم : ٥ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١٠٠ غ - ١/٢ كغ.



Antibiotic
NEOTETRA



www.acdivet.sy

COLIDIMA-2M Antibiotic



www.acdivet.sy



كوليديماء - ٢م

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرة) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdivma For Veterinary
Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdivma Amman-Jordan.



التركيب : كل ١ غ يحتوي على :
كوليستين (سلفات)
2,000,000 وحدة دولية
سواغات كمية كافية حتى
١ غ

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم كوليديماء بودرة ذوبان في الماء للعلاج و الوقاية من التهابات الامعاء البكتيرية و لعلاج الاسهال الفيروسي المعقّد ببكتيرية و لعلاج الاصابة بالعصيات القلوئية و السالمونيلا عند الدواجن و المجرات.

الجرعة و طريقة الاستعمال : بمقدار ملعقة ملئة مياه الشرب او بداخل الحليب من ٤-٥ أيام :

الدواجن: ١٠٠ غ / ٣٠٠ لتر ماء يوميا.

المجرات: ١ غ / ٢ كغ وزن حي يوميا.

فترة السحب :

لح المجرات: ٢ يوم - لحم الدواجن: ٣ أيام.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ كغ - ١ كغ.

أمبروديما 60%



التركيب: كل 1 غ يحتوي على :

600 ملг

أمبروليلوم هيدروكلورايد

1 غ

سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم أمبروديما لعلاج الكوكسيدينا الناتجة عن انواع الاميريا التالية: تينيلا، نيكاتريكس، برونتي، بوفيس، زورني، اسيروفولينا، بريوكس، مينش، ميلاغريدس، ادينوديس، غالوبافونس في الدواجن و المجترات و هو ذو تحمل جيد من قبل الحيوان.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

الدواجن:

الحالات الحادة: ٨٠ غ / ٢٠٠ ليلتر من ماء الشرب لمدة ٥ - ٧ أيام.

المعالجة العادمة: ٤٠ غ / ٢٠٠ ليلتر من ماء الشرب لمدة ٥ - ٧ أيام.

المعالجة الداعمة: ٢٠ غ / ٢٠٠ ليلتر من ماء الشرب لمدة ٨ - ١٠ أيام.

المجترات:


عن طريق الفم ٢ غ لكل ١٠٠ كغ من وزن الجسم يوميا و لمدة ٥ أيام.

جرعة يومية بتجديد ١,٥ - ٢ غ من أمبروديما ٦٠٪ في ١٠٠ مل ماء.

فترة السحب: الدواجن: ٣ أيام - المجترات: ١ يوم.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١ كغ .



Anticoccidial
Amprodima 60%



www.acdivet.sy

NEODIMA 30% Antibiotic

www.acdivet.sy



نيوديما %30

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرة) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary Medicines Industry (Acdivet) Ltd belongs to Acdima Amman-Jordan.



التركيب: كل 1 غ يحتوي على:
نيومايسين سلفات
سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

الدواجن: الاسهالات غير معروفة السبب والاصابة بالسالمونيلا و العصيات القولونية.

العجول و الحملان: الاصابة بالسالمونيلا و العصيات الكولونية.

الكلاب و الأمهار: الاصابة المعدية والمعوية.

الجرعة و طريقة الاستعمال يتموا عن طريق مياه الشرب.

الدواجن: ١٠٠ غ / ٢٠٠ ليتر من مياه الشرب لمدة ٥-٣ أيام.

العجول و الحملان: ٤،٠ غ / ١٠ كغ وزن حي كل ١٢-٦ ساعة و لمدة ٥-٣ أيام.

الأمهار: ٠،٢ غ / ١٠ كغ وزن حي كل ٢٤-١٢ ساعة و لمدة ٥-٣ أيام.

الكلاب: ٤،٠ غ / ١٠ كغ وزن حي كل ٦ ساعات و لمدة ٥-٣ أيام.

فترقة السحب : اللحم: ٣ أيام.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ كغ .

أكديما

التركيب: كل 100 غ يحتوي على :

- ديكستروز (55,800 ملخ) - غليسين (8,000 ملخ)
- فوسفات احادية الصوديوم (4,000 ملخ) - سينتريك أسيد (800 ملخ)
- ليمونات صوديوم (200 ملخ) - كلور الصوديوم (10,800 ملخ)
- كلور البوتاسيوم (5,000 ملخ)
- سواغات كمية كافية حتى 100 غ.

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

- يستخدم في الدواجن في ساعات التنزيل الأولى و خصوصا في حالات الصيchan المجهدة و المثقلة لفترات طويلة او الصيchan التي تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة بعد الفقس حيث يسهم في رفع جوية الصيchan و نشاطها و يعيد لها الوزن الطبيعي بعد الفاقد بعملية التخفاف الناتجة عن سوء النقل و يقلل لفترات طويلة في الفcasات بعد الفقس.
- رفع شهية الصوص لتناول العلف، خلال الساعات الأولى من التحضين في الحظائر مما يجعل في تكون الفلورا المعيشية الطبيعية و تنشيط الاماء و سرعة امتصاص كيس المح.
- يستخدم في الدواجن بشكل دوري في حالات الاجهاد والتخفاف او ارتفاع درجات الحرارة.
- يستخدم كفاتح للشهية و معالجة حالات نقص او انحراف الشهية.
- كمعالجة داعمة في جميع الامراض التي تتراافق مع الخمول و الضفت و الاجهاد و قلة النشاط و الحركة و فقدان الازان.
- في حال الامراض التي تتراافق مع ارتفاع في درجات الحرارة المستمرة.
- كمعالجة داعمة و اساسية في حالات الاسهال و حالات التخفاف الناتجة عن الاسهال المستمر. قبل نقل الحيوان و الطيور للبيح ب ٣ أيام من اجل تحسين نوعية اللحم و تجنب فقد الوزن.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطي مع مياه الشرب عن طريق الفم:

الدواجن : ٢٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب و لمدة ٤-٦ أيام او يشكل جر عات يومية بمقادير ٦ ساعات شرب خلال اليوم يسقها او يعقبها مياه نظيفة او مياه علاجية حسب المخطط العلاجي للقطيع. ويفضل ان يستخدم بشكل دوري بمعدل يوم واحد كل ٣-٤ أيام.

المجرات: ٤٠ غ / ١ لتر ماء شرب بمعدل ١٢ ساعة يوميا و لمدة ٤-٦ أيام.

فترقة السحب: لا يوجد.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعينة: عبوات سعة ١٠٠ غ - ١/٢ كغ - ١ كغ .



electrolytes
OSMODIMA

Dimavit-M-Plus Minerals & Amino acids


www.acdivet.sy



ديمافيت - م - بلس

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(اكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdivet For Veterinary
Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdiver Amman-Jordan.



التركيب: كل 100 غ يحتوي على :

فيتامين A (1000000 و.د) - فيتامين D3 (300000)
فيتامين E (1000 ملخ) - فيتامين C (1000 ملخ) - فيتامين B1 (200 ملخ)
فيتامين B2 (200 ملخ) - فيتامين B6 (200 ملخ) - فيتامين B12 (1ملخ)
فيتامين PP (نيكوتيناميد) (1500 ملخ) - كالسيوم - د بانثوئنات (1000 ملخ)
حمض الفوليك (50 ملخ) - فيتامين K3 (300 ملخ) - بيوتين (1.5 ملخ)
سلفات الحديد (500 ملخ) - سلفات المنغنيز (500 ملخ) - سلفات النحاس (100 ملخ)
سلفات البوتاسيوم (15 ملخ) - سلفات الزنك (500 ملخ) - سلفات الكوبالت (10 ملخ)
سيلينيوم الصوديوم (12.5) - حموض أمينية
سواغات كمية كافية حتى
100 غ.

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

من أجل تحسين التثبيل الغذائي و زيادة نسبة التحويل العلفي - زيادة إنتاج البيض في الدجاج البياض و جعل قشرة البيض أكثر صلابة و لمعان - زيادة نسب الإخصاب و القفس للبيض التفريغ - يستخدم بشكل عام في جميع حالات عوز الفيتامينات و المعادن و الأحماض الأمينية في حالات الإجهاد و من أجل رفع المناعة الطبيعية للطيور و الحيوانات - بعد المعالجة الطويلة و المجهدة و خلال مراحل النقاوة.

الجرعة و طريقة الاستعمال : فمويا عن طريق مياه الشرب أو العلف.

الدواجن: ١٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب لمدة ٧-٥ أيام.

العجول و الأمهار و المفاطيم: ٤-٢ غ للرأس يوميا و لمدة ٥-٣ أيام.

بالعلف: ١ كغ / طن علف و لمدة ٧-٥ أيام.

فترة السحب : لا يوجد.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١٠٠ غ - ١ كغ.

ماكسيفور بلس

التركيب: كل 1000 غ بحتوى على :

فيتامين أ 7,500,000 وحدة دولية) - فيتامين د (3,150,000 وحدة دولية)
 فيتامين E 6000 ملخ) - فيتامين ب 1 (1000 ملخ)
 فيتامين ب 2 (1500 ملخ) - فيتامين ب 6 (500 ملخ)
 فيتامين ب 12 (6 ملخ) - فيتامين ث (5000 ملخ)
 حمض الفوليك (100 ملخ) - فيتامين PP نيوكوتيناميد (1000 ملخ)
 فيتامين ك 3 (1000 ملخ) - كالسيوم - د بانتوثيكان (1000 ملخ)
 هستيدين (400 ملخ) - أيزوليبوين (800 ملخ) - ليبوين (1600 ملخ)
 ليسين (2700 ملخ) - ميثيونين (500 ملخ) - فنيل الألانين (600 ملخ)
 تريوبونين (700 ملخ) - تربوفان (160 ملخ) - فاللين (1100 ملخ)
 أرجinin (800 ملخ) - سيستيدين (700 ملخ) - غليسين (2000 ملخ)
 الألانين (1400 ملخ) - أسيبارتريك أسييد (1540 ملخ)
 سلفات الحديد (100 ملخ) - سلفات النحاس (10 ملخ)
 سلفات الزنك (250 ملخ) - سلفات المanganز (350 ملخ)
 سلفات المغنتيوم (2500 ملخ) - سلفات الكوبالت (5 ملخ)
 بود الكالسيوم (5 ملخ) - سواغات كمية كافية حتى 1000 غ.

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

من أجل تحسين التصنيع الغذائي و زيادة نسبة التحويل العلقي - زيادة إنتاج البيض في الدجاج البياض و جعل قشرة البيض أكثر صلابة و لمعان - زيادة نسب الإخصاب و القسم لبيض التفريخ - في حالات الإجهاد و من أجل رفع المناعة الطبيعية للطيور و الحيوانات - بعد المعالجة الطولية و المجهدة و خلال مراحل النقاوة.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يعطى مع مياه الشرب عن طريق الفم:

الدواجن: ٢٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب لمدة ٧-٥ أيام.
 العجول والأغنام والأمهار و المفاطيم: ٢٠٠ غ / ٢٠٠ لتر من ماء الشرب لمدة ٧-٥ أيام.
 بالعلف: ١ كغ / طن علف و لمدة ٧-٥ أيام.

فترقة السحب: لا يوجد.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١٠٠ غ - ١/٢ كغ - ١ كغ.



vitamins
MAXIFOR-PLUS



www.acdivet.sy

SECOVIT vitamins & Antibiotics

www.acdivet.sy



سيكوفيت



ال التركيب: كل 1 غ يحتوي على :

اريزومايسين ثيوبيساتن (35 ملخ) - اووكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد (50 ملخ)
كوليستين سلفات (2,25000 وحدة دولية) - ستريتومايسين سلفات (35 ملخ)
فيتامين A (3000 وحدة دولية) - فيتامين D3 (1500) وحدة دولية)
فيتامين E (2 ملخ) - فيتامين C (20 ملخ) - فيتامين K3 (2 ملخ)
فيتامين B1 (2 ملخ) - فيتامين B2 (4 ملخ) - فيتامين B6 (2 ملخ)
فيتامين B12 (10 ميكروغرام) - فيتامين PP (نيكوتيناميد) (20 ملخ)
كالسيوم - د بانثوئنات (10 ملخ) - سواغات كمية كافية حتى 1 غ.

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يحتوي مركب السيكوفيت على مجموعة من أربعة مضادات حيوية واسعة الطيف و بالتالي يمكن استخدامه في الوقاية والعلاج ضد الأمراض الناتجة عن الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام مثل كوليريا الطيور، المرض التنفسى العمرى، الرشح المعدى، التهاب الأمعاء، الأحشاء الناشئة عن المكورات العنقودية والعقدية، والإسهالات الناجمة عن الجراثيم السلبية و إيجابية الغرام بالإضافة إلى التهابات الجهاز التنفسى العلوى و التهاب القصبات و الرئتين الناجمة عن مختلف أنواع المتعضيات السلبية و إيجابية الغرام. يحتوى المستحضر على مجموعة واسعة من الفيتامينات الضرورية للحصول على تحسين النمو والمخصوص على إنتاجية عالية وتعزيز نقص الفيتامينات ورفع الحالة المناعية للطيور و زيادة إنتاج البيض و تحسين القشرة و رفع جاهزية الطيور للتزاوج و رفع نسب الإخصاب و الفقس، عند الدواجن و طيور الزينة و المحجرات.

الجرعة و طريقة الاستعمال : فمويا عن طريق مياه الشرب.

العلاج: ١ غ لكل لิتر ماء شرب لمدة ٧-٥ أيام.
الوقاية: ٠،٥ غ لكل لิتر ماء شرب لمدة ٧-٥ أيام.

فترة السحب : اللحم ٢١ يوم

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: كيس سعة ٥٠ غ - عبوة سعة ١٠٠ غ.

نيوميتال

التركيب: كل 1000 غ يحتوي على :

سلفات الحديد (1000 ملخ) - سلفات المنغنيز (5000 ملخ)
 سلفات المغنتيوم (3000 ملخ) - سلفات النحاس (15000 ملخ)
 بود البوتاسيوم (5000 ملخ) - سلفات الزنك (100 ملخ)
 سلفات الكوبالت (50 ملخ) - سيلينيات الصوديوم (100 ملخ)
 كلوريد الصوديوم (25000 ملخ)
 سواغات (كمية كافية حتى 1000 غ).

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يستخدم نيوميتال في الحالات التالية:

- زيادة إنتاج الحليب عند الأبقار و الأغنام و الماعز.
- من أجل تحسين الأوزان من خلال تحسين التثبيط الغذائي و زيادة نسبة التحويل العلفي.
- زيادة إنتاج البيض في الدجاج البياض.
- زيادة نسب الإخصاب و الفقس لبيض التفريخ.
- جعل قشرة البيض أكثر صلابة و لمعان.
- يستخدم بشكل عام في جميع حالات عوز المعادن.
- في حالات الإجهاد.
- من أجل رفع المناعة الطبيعية للطيور و الحيوانات.
- بعد المعالجة الطويلة و المجهدة و خلال مراحل النقاوة.


الجرعة و طريقة الاستعمال : فموياً عن طريق العلف للدواجن و المجترات و الخيول:

٣-٢ كغ لكل طن من العلف.

فترقة السحب: لا يوجد.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ١٥-٢٥ درجة مئوية.

التعبئة: كيس سعة ١ كغ - سطل سعة ٢٠ كغ.



Minerals
NEWMITAL

NEW-MITALVIT

vitamins & Minerals


www.acdivet.sy



نيو- ميتالفيت

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdiva For Veterinary
Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdiva Amman-Jordan.



التركيب: كل 1000 غ يحتوي على :

فيتامين A (2,000,000 وحدة دولية) - فيتامين D3 (500,000 وحدة دولية)
فيتامين E (2500 ملخ) - سلفات الحديد (5000 ملخ) - سلفات المغنيسيوم (1000 ملخ)
سلفات المغزريوم (15000 ملخ) - سلفات النحاس (3000 ملخ)
بود البوتاسيوم (100 ملخ) - سلفات الزنك (5000 ملخ) - سلفات الكوبالت (50 ملخ)
سيلينات الصوديوم (100 ملخ) - كلوريد الصوديوم (25000 ملخ)
سواغات كبرى حتى (1000 غ).

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

- زيادة إنتاج الطليب عند الأبقار والأغنام والماعز.
- من أجل تحسين الأوزان من خلال تحسين التمثيل الغذائي وزيادة نسبة التحويل العلقي.
- زيادة إنتاج البيض في الدجاج البياض.
- زيادة نسب الإخصاب والفقس لبيض التفريخ.
- جعل قشرة البيض أكثر صلابة و لمعان.
- يستخدم بشكل عام في جميع حالات عوز المعادن.
- في حالات الإجهاد.
- من أجل رفع المناعة الطبيعية للطيور و الحيوانات.
- بعد المعالجة الطولية و المجهدة و خلال مراحل النقاوة.
- في جميع الحالات المرضية الناتجة عن نقص الفيتامينات و المعادن.

الجرعة و طريقة الاستعمال : فموياً عن طريق العلف للدواجن و المجترات و الخيول:

٣-٢ كغ لكل طن من العلف.

فترقة السحب : لا يوجد.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ١٥-٢٥ درجة مئوية.

التعبئة: كيس سعة ١ كغ - سطل ٢٠ كغ .

ديمابيرين - ك



التركيب: كل ١ غ يحتوي على :

نوفالجين	350 ملغم
فيتامين C	120 ملغم
فيتامين K3	30 ملغم
سواغات كمية كافية حتى	١ غ.

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

- خافض للحرارة في حالات الإصابة الجرثومية و الفيروسية و خاصة مرض الجمورو
- آلام المفاصل و حالات التزف المرافق لبعض الأمراض
 - أثناء التحصين

الجرعة و طريقة الاستعمال : فموياً عن طريق مياه الشرب :

- الدواجن: ١٠٠ غ - ٢٠٠ غ / ٢٠٠ ليتر ماء شرب و لمدة ٥-٣ أيام.
- الأبقار و الخيول: ٥٠ غ لكل حيوان مرتبين باليوم و لمدة ٢ يوم.
- الأغنام و الماعز: ٥ - ١٠ غ لكل حيوان مرتبين باليوم و لمدة ٢ يوم.

فترة السحب: لا يوجد.

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات سعة ١/٢ كغ - ١ كغ .



Antipyretic & vitamins
DIMAPYRINE-K

ENRODIMA 10% Antibiotic



www.acdivet.sy

إنروديما ١٠%

إنتاج: أكديما لصناعة الأدوية البيطرية
(أكبيطرا) م.م. التابعة لشركة أكديما - عمان - الأردن

Production: Acdima For Veterinary
Medicines Industry (Acdivet) Ltd
belongs to Acdima Amman-Jordan.



100 مل
1 مل.

ال التركيب: كل 1 مل يحتوي على:
إنروفلوكساسين
سواغات كافية حتى

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

يوصى باستعمال إنروديما لعلاج أغلب الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسى والجهاز
الهضمى والجهاز البولى التناسلى والرحم بالإضافة إلى أمراض أخرى تسببها معظم
الجراثيم إيجابية الغرام وسالية الغرام بما فيها السالمونيلا بالإضافة إلى الميكوبلازما
في الأبقار والجاموس والأغنام والماعز الكلاب والقطط والأرانب والدواجن والخنازير.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

عن طريق الحقن تحت الجلد في الأبقار والجاموس والماعز الكلاب و
القطط والأرانب والدواجن أو عن طريق الحقن العضلي في الأغنام.

● الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والخنازير:
٢,٥ مل إنروفلوكساسين لكل ١ كغ وزن حي أي ما يعادل (٥٠ مل إنروديما ١٠٪
لكل ٢٠ كغ وزن حي).

- و ينبعى مضاعفة الجرعة في حال الإصابة التنسفية الشديدة أو الإصابة بالسالمونيلا.

الكلاب والقطط والأرانب والدواجن: ٥ مل إنروفلوكساسين لكل ١ كغ
وزن حي أي ما يعادل (٥٠ مل من إنروديما ١٠٪ لكل ١٠ كغ وزن حي).

- مدة العلاج هي ثلاثة أيام بشكل عام وتصبح ٥ أيام في حال الإصابة بالسالمونيلا.

- عند إصابة العجول الرضيعة بالسالمونيلا يكون من المناسب إعطاء العلاج بشكل
حقن في اليوم الأول ثم يتم الانتقال إلى العلاج عن طريق الفم في الأيام التالية.

فترقة السحب : للحم ١٤ - يوم الحليب ٧ أيام - لحم الدجاج ٨ أيام

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات زجاجية ١٠٠ مل.

تيلوديما 20

التركيب: كل 1 مل يحتوي على :

200 ملг

1 غ

سواغات كمية كافية حتى

الاستطباب:

إن تيلوديما فعال في الحالات التالية: التهابات الجهاز التنفسى : التهاب الرئة و الحنجرة و القصبات - الإصابة باللينوسبيرا (داء البريميات) - التهابات الأذن - التهابات المفاصل - التهابات المرضع.

الحيوانات المعالجة :

الجمال والأبقار والأغنام والماعز والدواجن والحيش والكلاب والقطط والخنازير.

الجرعة و طريقة الاستعمال : يستعمل عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد.


المجراثات و الحيوانات الصغيرة: ٥،٠ مل لكل ١٠ كغ وزن حي كل ٢٤ ساعة ولمدة ٥-٣ أيام.

الدواجن والرومي: ١ مل لكل ١٠ كغ وزن حي ولمدة ٣ أيام.

فترة السحب: اللحم: ٢١ يوم - الحليب: ٤ أيام

الحفظ : في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة ٢٥-١٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوات زجاجية سعة ١٠٠ مل.



Antibiotic
TYLODIMA - 20



www.acdivet.sy

LINCOSPECT - INJ Antibiotic



www.acdivet.sy



لينكوسبيكت - INJ



ال التركيب: كل 1 مل يحتوي على :
لينكومايسين هيدروكلورايد تعادل لينكومايسين أساس 50 ملغ
سيبكتينومايسين سلفات تعادل سيفكتينومايسين أساس 100 ملغ
سواغات كمية كافية حتى 1 مل

الاستطباب و الحيوانات المعالجة :

في معظم الحالات المرضية والتي مسببها يتبع العضويات الحساسة لتأثير كلاً من
اللينكومايسين والسيبكتينومايسين، الخراجات والاصابات الجلدية (الجرمة الخبيثة ، الدمامل)
- التهاب الورزتين - التهاب المفاصل - الإصابة الرئوية الفصبية - التهاب القصبات الحاد
- التهاب المثانة - التهاب الأمعاء (النففي - العصوي) - التهاب الباعوم - التهاب
الغدد المتفاورة - التهاب الرحم - التهاب الضرع - الإصابة بالمايكوبلازمـا- التهاب
الرئة - التسمم الدموي عند الأبقار والأغنام والماعز - الكلاب و القطط.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الحقن العضلي:

الجرعة المقرحة 1 مل لكل 10 كغ وزن حي يومياً ولمدة 4-3 أيام.

الكلاب و القطط : 2 مل لكل 10 كغ وزن حي يومياً.

الأبقار والأغنام والماعز: 1 مل لكل 10 كغ وزن حي يومياً.

الدواجن: 1 مل لكل 5 كغ وزن حي تحت الجلد.

حسب شدة الأعراض و من المستحسن حقن العجول مرة ثانية بعد 12 ساعة في اليوم الأول

فترقة السحب : اللحم: 14 يوم.

الحفظ: في مكان جاف و مظلم و بدرجة حرارة 25-15 درجة مئوية.

التعبئة: عبوات زجاجية 100 مل.